

GreenOK UNIVERSAL–PRO koncentrat/concentrate

(Nr rejestracyjny / registratio no – G0.06-0690-10)

**(NPK 0,13-0,09-0,7) - Azot całkowity (Total N) 0,13%, Fosfor całkowity (Total P₂O₅) 0,09%,
Potas całkowity (Total K₂O) 0,7%, Sucha masa (dry matter) 22g/l, wilgotność (humidity)
96%, Substancje organiczne (organic matter) 3 %, pH 7-9**

Stosować w rozcieńczeniu z wodą, zgodnie z proporcjami przedstawionymi w tabeli. Można stosować w postaci oprysku, roztworu do podlewania lub jako preparat do aktywacji kiełkowania i ukorzenia (moczenie przed siewem, sadzeniem).

Może być używany z innymi nawozami mineralnymi oraz środkami ochrony roślin – przed zmieszaniem produktów zalecane jest przeprowadzenie testu zgodności.

Gatunek rośliny (Crop specie)	Zalecane dawkowanie (Recommended doses)	Ilość/obszar (value/area)	Rekomendowany sposób i czas stosowania (Usage and time recommendation)
Zboża (Cereals)	25ml / 10 l wody (water)	1 T nasion (1 Mg of seeds)	Stymulacja kiełkowania nasion, należy moczyć lub spryskać przed wysiewem (seeds germination improvement – spray or soak seeds before sowing)
	100ml / 200 l wody (water)	1 ha	Żywnienie dodatkowe przez liście. Stosować w wczesnej fazie wzrostu lub przed kwitnieniem (Feeding additionally through leaves in the full seedling phase or before blooming phase)
Rośliny strączkowe, oleiste, rzepak (Pulse, rapeseed)	50ml/20 l wody (water)	1 T nasion (1 Mg of seeds)	Stymulacja kiełkowania nasion, należy moczyć lub spryskać przed wysiewem (seeds germination improvement – spray or soak seeds before sowing)
	150ml/200 l wody (water)	1 ha	Żywnienie dodatkowe przez liście w wczesnej fazie wzrostu, można stosować również jako oprysk jesienny (Feeding additionally through leaves in the full sprouting phase, can be use also during the autum as a additional tratment)
Rośliny bulwiaste, ziemniaki (Cormous plants, potato)	50ml/20 l wody (water)	1 T bulw (1 Mg of tubers)	Moczenie bulw przed wysiewem (Tuber processing before planting)
	100-150 ml/200 l wody (water)	1 ha	Żywnienie dodatkowe przez liście we wczesnej fazie wzrostu (Feeding additionally through leaves in the early growing phase)
Krzaki i drzewa owocowe, w tym borówki (Berry bushes, fruit trees)	200ml/800 l water	1 ha	Żywnienie dodatkowe przez liście w fazie rozwoju liści (Feeding additionally through leaves in the leaves opening period)
	300ml/800 l water	1 ha	Żywnienie dodatkowe przez liście, w okresie przed rozwojem kwiatów (Feeding additionally through leaves in the flower buds development phase – at the beginning of flowering)
Trawniki oraz poprawa jakości gleby (Lawns and soil quality improvement)	100ml/10 l water	1 T nasion (1 Mg of seeds)	Stymulacja kiełkowania nasion, należy moczyć lub spryskać przed wysiewem (seeds germination improvement – spray or soak seeds before sowing)
	150-200 ml/200 l wody (water)	1ha	Żywnienie dodatkowe przez liście (Feeding additionally through leaves)